引用本文:陶艳红,刘健,徐昌萍,等.新风胶囊调控巨噬细胞M1/M2型极化对DBA/1小鼠胶原诱导型关节炎的影响[J].安徽医药,2023,27(2):241-245.DOI:10.3969/j.issn.1009-6469.2023.02.007.

◇ 药学研究 ◇

新风胶囊调控巨噬细胞M1/M2型极化对DBA/1小鼠胶原诱导型关节炎的影响

陶艳红¹,刘健²,徐昌萍¹,陈君洁¹,周娜¹,王泽¹,曹云祥²,黄传兵²

作者单位:¹安徽中医药大学研究生院,安徽 合肥230031;

²安徽中医药大学第一附属医院风湿免疫科,安徽 合肥230031

通信作者:曹云祥,男,副主任医师,副教授,硕士生导师,研究方向为中医药防治风湿免疫病,Email:cyx800805@163.com

基金项目:国家自然科学基金面上项目(82074090,81473672);安徽省自然科学基金面上项目(1808085MH303);

安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2020A0403)

摘要: **目的** 探究新风胶囊调控巨噬细胞M1/M2型极化对DBA/1小鼠胶原诱导型关节炎(CIA)的影响。**方法** 按体质量将DBA/1小鼠采用随机数字表法分为空白对照组(NC组)、模型组(M组)和新风胶囊组(XFC组)三组。M组和XFC组建立Ⅱ型胶原合并弗氏佐剂诱导的CIA小鼠模型,第二次免疫当天,NC组和M组给予生理盐水,XFC组按照规定剂量给予新风胶囊混悬液1.5 mL/100 g,每天1次,连续21 d灌胃处理。利用小鼠关节炎指数(AI)评分评估新风胶囊对CIA模型小鼠关节的作用,HE染色检测滑膜组织病理损伤程度;蛋白质印迹法(Western blotting)检测巨噬细胞中CD68、iNOS蛋白表达水平。研究时间自2020年6月至2021年5月。**结果** 实验结果表明,与NC组相比,滑膜炎性细胞浸润数量及血管翳增生数量较前升高,第30天M组发病关节炎爪数[(3.83 ± 0.41)只]明显增多($P < 0.05$),右后爪关节炎严重程度评分[(2.83 ± 0.75)分]上升($P < 0.05$),四肢关节炎评分均值[(2.17 ± 0.38)分]升高($P < 0.05$),CD68相对表达量(0.964 ± 0.080)高于NC组(0.430 ± 0.0186)($P < 0.05$),iNOS相对表达量(0.738 ± 0.052)高于NC组(0.477 ± 0.016)($P < 0.05$)。与M组比较,第30天XFC组滑膜炎性细胞浸润数量及血管翳增生数量均下降,发病关节炎爪数[(1.50 ± 0.55)只]低于M组[(3.83 ± 0.41)只]($P < 0.05$),右后爪关节炎严重程度评分[(1.00 ± 1.10)分]低于M组[(2.83 ± 0.75)分]($P < 0.05$),四肢关节炎评分均值[(0.75 ± 0.27)分]低于[(2.17 ± 0.38)分]($P < 0.05$),CD68相对表达量(0.632 ± 0.017)低于M组(0.964 ± 0.080)($P < 0.05$),iNOS相对表达量(0.572 ± 0.036)低于M组(3.83 ± 0.41)($P < 0.05$)。**结论** 新风胶囊改善CIA小鼠体内炎症诱导的关节滑膜损伤,可能通过抑制巨噬细胞向M1型极化,从而减少炎症因子的释放。

关键词: 关节炎,类风湿; 新风胶囊; 巨噬细胞; 炎症因子

Effects of *Xinfeng* capsule on M1/M2 polarization of macrophages on collagen-induced arthritis in DBA/1 mice

TAO Yanhong¹, LIU Jian², XU Changping¹, CHEN Junjie¹, ZHOU Na¹, WANG Ze¹,
CAO Yunxiang², HUANG Chuanbing²

Author Affiliations:¹Graduate School of Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei, Anhui 230031, China;

²Department of Rheumatology, The First Affiliated Hospital of Anhui University of Traditional Chinese Medicine, Hefei, Anhui 230031, China

Abstract: **Objective** To investigate the effects of *Xinfeng* capsule on M1/M2 polarization of macrophages on collagen-induced arthritis (CIA) in DBA/1 mice. **Methods** According to body weight, DBA/1 mice were randomly divided into three groups: blank control group (NC group), model group (M group) and *Xinfeng* capsule group (XFC group). CIA mouse model induced by type II collagen combined with fredrin's adjuvant was established in M group and XFC group. On the day of the second immunization, NC group and M group were given normal saline, XFC group was given *Xinfeng* capsule suspension at the specified dose of 1.5 mL/100 g, once a day, for 21 consecutive days. Arthritis Index (AI) score was used to evaluate the effects of *Xinfeng* capsule on CIA model mice joints, and HE staining was used to detect the degree of synovial tissue pathological damage. The expression levels of CD68 and iNOS in macrophages were detected by Western blotting. The study period was from June 2020 to May 2021. **Results** The results showed that compared with NC group, the number of synovial inflammatory cell infiltration and pannus hyperplasia increased, and the number of arthritic claws in M group [(3.83 ± 0.41)] significantly increased on day 30 ($P < 0.05$), the severity score of right posterior paw arthritis [(2.83 ± 0.75) points] increased ($P < 0.05$), the mean score of limb arthritis [(2.17 ± 0.38) points] increased ($P < 0.05$), the relative expression of CD68

(0.964 ± 0.080) was higher than that of NC group (0.430 ± 0.0186) ($P < 0.05$), the relative expression of iNOS in NC group (0.738 ± 0.052) was higher than that in NC group (0.477 ± 0.016) ($P < 0.05$). Compared with M group, XFC group decreased the number of synovial inflammatory cell infiltration and pus hyperplasia on day 30, and the number of arthritic claws [(1.50 ± 0.55)] was lower than that of M group [(3.83 ± 0.41)] ($P < 0.05$), the severity score of right posterior paw arthritis [(1.00 ± 1.10) points] was lower than that of M group [(2.83 ± 0.75) points] ($P < 0.05$), the mean score of limb arthritis [(0.75 ± 0.27) points] was lower than [(2.17 ± 0.38) points] ($P < 0.05$), the relative expression of CD68 (0.632 ± 0.017) was lower than that of M group (0.964 ± 0.080) ($P < 0.05$), the relative expression of iNOS (0.572 ± 0.036) was lower than that of M group (3.83 ± 0.41) ($P < 0.05$). **Conclusion** Xinfeng capsule ameliorates arthritides-induced synovial injury in CIA mice, possibly by inhibiting m1-type polarization of macrophages, thereby reducing the release of inflammatory factors.

Key words: Arthritis, rheumatoid; Xinfeng capsule; Macrophages; Inflammatory cytokines

类风湿关节炎 (rheumatoid arthritis, RA) 是一种以关节滑膜炎为特征的自身免疫性疾病,其特征是由浸润性的滑膜炎导致的关节损伤,进而产生软骨和骨质侵蚀,最终引起关节畸形,对病人的日常活动有着严重不良影响^[1]。虽然 RA 的确切发病机制尚不清楚,前期多项研究发现巨噬细胞是引起 RA 的关键性因素之一。巨噬细胞是机体的免疫细胞,被发现可趋化至关节滑膜处,参与机体炎症反应^[2-5]。现代研究表明,巨噬细胞能够发挥免疫应答作用,进而维持机体内环境的稳态,当这种动态平衡被打破时,在特定环境下,巨噬细胞可极化为 M1 和 M2 型, M1 型分泌大量的炎性因子,如肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、白细胞介素 (IL)-6、IL-1 等,同时 TNF- α 还可活化免疫细胞中的核转录因子- κ B (NF- κ B) 信号通路,放大炎症效应,从而引起并加剧组织细胞损伤, M2 型释放抗炎因子,可降低人体的炎症反应,在组织修复中发挥作用^[6-7]。通过建立 RA 动物模型,研究人员发现促进滑膜组织的巨噬细胞凋亡或抑制 M1 型极化,可达到缓解 RA 的目的^[8-9]。由此可见,调控巨噬细胞 M1/M2 型极化可有效干预滑膜组织中炎症的发展。

目前,西医在临床治疗上采用非甾体抗炎药、抗风湿药物、糖皮质激素和生物制剂等虽然能够有效地改善 RA 的长期治疗预后,但同时也伴随着对人体肝、肾脏各项机能的损害、胃肠道反应和白细胞数量的减少等多种情况导致的不良反应^[10]。因此,寻找一条新的辅助治疗思路极为迫切,近年来,随着中医中药的发展与崛起,传统中医药具有成本低、毒副作用小、整体调理等优势,其在 RA 中的推广与使用引起了人们越来越广泛的关注。新风胶囊 (Xinfeng capsule, XFC) 是安徽中医药大学第一附属医院生产的中药复方制剂,由黄芪、薏苡仁、雷公藤、蜈蚣四种中药材组成,具有益气健脾、通络止痛之功。课题组前期研究证实, XFC 被发现可以减轻实验动物 RA 症状,并具有抗炎功能,但其缓解 RA 潜在的调控机制尚需深入研究^[11-12]。本研究自 2020 年 6 月至 2021 年 5 月以胶原诱导型关节炎 (collagen-

induced arthritis, CIA) 小鼠为模型,巨噬细胞极化为主线,通过动物体内外实验来探讨 XFC 调控巨噬细胞极化对改善 RA 的影响。

1 材料与方法

1.1 实验动物 SPF 级雄性 DBA/1 小鼠购自北京华阜康,许可证号 SCXK(京)2019-0008。饲养于安徽中医药大学动物实验中心,实验光照时间为 7 点至 19 点,研究人员将饲养环境设置为室温 20~26 °C、相对湿度 40%~70%,在该条件下对小鼠实施适应性喂养。最后取 18 只 7~8 周龄,体质量 18~22 g 的雄性小鼠开展实验。

1.2 试剂与仪器

1.2.1 实验药品与试剂 牛源性 II 型胶原购于美国 Chondrex; HE 染色试剂盒、蛋白质印迹 (Western blotting) 试剂盒购于碧云天,二甲苯购于上海化学试剂有限公司;全蛋白提取试剂盒购于上海源叶生物科技有限公司;二辛可宁酸 (BCA) 蛋白检测试剂盒购自江苏凯基生物公司;增强化学发光法 (ECL) 发光液购自 Millipore;聚偏二氟乙烯膜 (PVDF) 购自 Bio-Rad。

1.2.2 主要仪器 冰冻切片机购自日本 Olympus 公司;电泳仪购自福祿克国际;凝胶成像仪购自 SIM 公司;4 °C 冰箱购于北京福意电器有限公司;转膜仪购自 Bio-Rad。

1.3 方法

1.3.1 CIA 模型的建立、分组和给药 小鼠适应性饲养 1 周后,按体质量随机分为三组,分别为 NC 组、M 组和 XFC 组,每组 6 只。选用 M 组和 XFC 组开始造模。将 2 g/L 牛源性 II 型胶原 (bovine collagen II, B II) 在等量 Freund's complete adjuvant 中进行乳化,在小鼠尾根部皮下注射 100 μ L 乳化 B II。第 21 天将 B II 在等量 Freund 不完全佐剂中进行乳化并以同样的方式加强免疫。第二次免疫当天, XFC 组每天灌胃一定浓度的实验药物治疗。鉴于课题组前期研究基础, NC 组及 M 组予生理盐水灌胃, 1 mL/100 g, 每天 1 次。 XFC 组: 新风胶囊混悬液 1.5 mL/100 g 灌胃, 每天 1 次^[13]。持续给药至二个时间节点

(42 d)处死小鼠取材,第42天处死小鼠进行关节滑膜组织检测。

1.3.2 记录关节炎指数 (arthritis index, AI) 评分 首次免疫后,研究人员每3 d记录各组小鼠发生关节炎的爪数,并对每只关节炎爪的关节严重程度进行评分。计算平均值并连续记录至第42天。AI评分最高为16分,按照AI评分标准将四肢红肿程度评为1~4分。0分:无红肿;1分:轻微发红;2分:中度发红;3分:全足明显红肿;4分:全足红肿,伴关节变形和运动障碍。AI评分 ≥ 1 分即为造模成功^[14]

1.3.3 HE染色法观察滑膜组织病理学变化 取小鼠右后肢,4%多聚甲醛固定,乙醇分步脱水,二甲苯透明后石蜡浸渍,包埋,制成蜡块后切成4 μm 薄片;将蜡块组织依次浸入二甲苯(I)及二甲苯(II)各10 min,随后将乙醇分步脱水,用蒸馏水洗涤2 min;苏木素染色5 min,清水冲洗1 min,盐酸乙醇分化20 s,酸水、氨水复蓝20 s,伊红染色5 min,再次使用乙醇分步脱水,经二甲苯使切片透明,将透明的切片滴上树胶,然后用盖玻片密封,制成中性树胶封片,显微镜下观察小鼠关节的形态和结构。

1.3.4 Western blotting检测蛋白表达水平 用预冷的PBS缓冲液洗涤关节滑膜组织,加入50 μL 裂解液,并与100 mol/L PMSF以100:1混合制备,处理25 min至完全裂解,然后将蛋白吸于EP管,在4 $^{\circ}\text{C}$, 12 000 r/min下离心5 min,吸取上清置于-80 $^{\circ}\text{C}$ 环境中,分装保存。用BCA试剂盒测量OD值,计算蛋白量,配制SDS-PAGE凝胶,加入样品,使样品在100 V电泳条件下分离,恒定电流转移至预先准备的PVDF膜上1 h。使用5%的脱脂奶粉封闭2 h,加入稀释后的CD68抗体、iNOS抗体、GAPDH抗体,摇床

4 $^{\circ}\text{C}$ 孵育过夜。将一抗回收,用Western液洗涤5~10 min,共3次,二抗同样孵育1 h,用Western液洗涤,ECL试剂检测蛋白。

1.4 统计学方法 使用SPSS 21.0软件进行统计分析,数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示,多组间比较采用单因素方差分析,两两比较使用LSD-*t*检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 CIA造模成功及关节炎严重程度评分 M组、XFC组小鼠造模后足爪均充血红肿,关节开始出现畸形,小鼠活动受限,NC组四肢无红肿、畸形,AI评分为0。第二次免疫开始,每3 d记录发生关节炎的爪数、右后爪关节炎严重程度评分和四肢关节炎评分均值。实验结果表明:

①首次免疫后21 d~42 d,NC组小鼠四肢发生关节炎的次数为0,M组和XFC组发病的关节数量均高于NC组,随着时间延长,两组的关节炎爪数也相应升高,M组于致炎30 d发病至最高峰,后保持不变;与M组比较,XFC组上升速度明显减缓,发病爪数明显减少(表1)。

②首次免疫后21~42 d,NC组右后爪关节炎严重程度评分为0,M组评分随时间延长明显上升后缓慢下降,XFC组评分缓慢上升后缓慢下降,且上升幅度始终低于M组(表2)。

③首次免疫后21~42 d,NC组四肢评分均值为0,随着造模时间延长,M组四肢评分均值缓慢上升,XFC组先缓慢上升,于致炎第39天至最高峰,后出现逐渐下降趋势,且XFC组评分均值始终低于M组(表3)。

表1 新风胶囊(XFC)对免疫后不同时间胶原诱导型关节炎(CIA)小鼠发生关节炎爪数的影响/ $\bar{x} \pm s$

组别	鼠数	21 d	24 d	27 d	30 d	33 d	36 d	39 d	42 d
NC	6	0	0	0	0	0	0	0	0
M	6	0	0.83 $\pm$ 0.75 ^①	2.17 $\pm$ 0.41 ^①	3.83 $\pm$ 0.41 ^①				
XFC 1.5 mL/100 g	6	0	0.50 $\pm$ 0.55 ^{①②}	1.00 $\pm$ 0.63 ^{①②}	1.50 $\pm$ 0.55 ^{①②}	1.67 $\pm$ 0.52 ^{①②}	1.83 $\pm$ 0.41 ^{①②}	2.00 $\pm$ 0.63 ^{①②}	2.17 $\pm$ 0.41 ^{①②}
F值			3.65	37.35	143.93	153.46	198.50	116.77	199.50
P值			0.051	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注:①与NC组比较, $P < 0.05$ 。②与M组比较, $P < 0.05$ 。

表2 新风胶囊(XFC)对免疫后不同时间胶原诱导型关节炎(CIA)小鼠右后爪关节炎严重程度评分的影响/(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	鼠数	21 d	24 d	27 d	30 d	33 d	36 d	39 d	42 d
NC	6	0	0	0	0	0	0	0	0
M	6	0	0.50 $\pm$ 0.84 ^①	1.17 $\pm$ 0.75 ^①	2.83 $\pm$ 0.75 ^①	2.67 $\pm$ 0.52 ^①	2.67 $\pm$ 0.52 ^①	2.67 $\pm$ 0.52 ^①	2.50 $\pm$ 0.55 ^①
XFC 1.5 mL/100 g	6	0	0.33 $\pm$ 0.52 ^{①②}	0.50 $\pm$ 0.84 ^{①②}	1.00 $\pm$ 1.10 ^{①②}	1.33 $\pm$ 1.03 ^{①②}	1.33 $\pm$ 0.82 ^{①②}	1.17 $\pm$ 0.75 ^{①②}	1.17 $\pm$ 0.75 ^{①②}
F值			1.21	4.87	21.04	24.000	34.29	38.60	32.50
P值			0.327	0.023	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注:①与NC组比较, $P < 0.05$ 。②与M组比较, $P < 0.05$ 。

表3 新风胶囊(XFC)对免疫后不同时间胶原诱导型关节炎(CIA)小鼠四肢关节炎评分均值的影响/(分, $\bar{x} \pm s$)

组别	鼠数	21 d	24 d	27 d	30 d	33 d	36 d	39 d	42 d
NC	6	0	0	0	0	0	0	0	0
M	6	0	0.25 ± 0.27 ^①	0.92 ± 0.47 ^①	2.17 ± 0.38 ^①	2.17 ± 0.34 ^①	2.25 ± 0.27 ^①	2.21 ± 0.25 ^①	2.29 ± 0.33 ^①
XFC 1.5 mL/100 g	6	0	0.13 ± 0.14 ^{①②}	0.33 ± 0.20 ^{①②}	0.75 ± 0.27 ^{①②}	0.75 ± 0.25 ^{①②}	0.79 ± 0.19 ^{①②}	0.83 ± 0.26 ^{①②}	0.79 ± 0.19 ^{①②}
F值			3.00	15.00	100.58	130.75	212.36	176.15	167.21
P值			0.080	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

注:①与NC组比较, $P < 0.05$ 。②与M组比较, $P < 0.05$ 。

2.2 CIA 小鼠踝关节组织 HE 染色结果 NC组关节组织形态结构正常,滑膜腔内未见明显炎性细胞浸润,M组滑膜腔内可见炎性细胞浸润及血管翳形成,软骨表面被侵蚀,增生滑膜侵入皮下。与M组相比,XFC组滑膜腔内血管翳减少,关节组织结构基本正常(图1)。

2.3 XFC 降低 CIA 小鼠滑膜组织 CD68、iNOS 的蛋白表达水平 蛋白质印迹法结果表明:与NC组比较,M组与XFC组小鼠滑膜组织中CD68、iNOS蛋白表达均增加;与M组相比,XFC组小鼠滑膜组织中CD68和iNOS蛋白表达降低($P < 0.05$)。见图2。

注:1—CAPDH;2—iNOS;3—CD68;4—正常组;5—模型组;6—XFC治疗组。

图2 XFC对CIA小鼠滑膜组织CD68、iNOS的蛋白表达的影响

3 讨论

RA属于中医“痹证”范畴,因其病程长而难以治愈,后人称之为“尪痹”,是风湿免疫科的常见病症之一^[15]。临床上RA多表现为关节肿痛,严重者可导致关节变形。RA的病理基础为滑膜炎。本研究结果发现,XFC具有降低CIA小鼠模型AI评分、血管翳形成和滑膜炎细胞浸润数量,降低关节滑膜组织中CD68、iNOS的蛋白表达水平的作用。表明XFC具有改善CIA小鼠体内炎症诱导的关节滑膜损伤的功能。

作为公认研究人类RA的经典动物模型,CIA小鼠易感且成本较低,能够模拟RA的治疗作用,目前是人类较为理想的动物模型^[16]。由于该动物模型造模成熟和发病稳定,而被广泛应用于RA治疗的多个研究和探索的领域,因此,选用CIA模型突出了XFC治疗作用的靶点。中药复方XFC遵循中医整体调节的原则,方中黄芪益气健脾;薏苡仁可达健脾利湿、舒筋除痹之功;雷公藤消肿止痛;蜈蚣祛风通络止痛,根据现代药理学研究成果,方中选用的

中草药具有抗风湿、调节免疫、抗炎等药理作用^[17]。课题组初步发现,使用XFC治疗AA大鼠后,血清中IL-10显著升高,IL-17水平显著降低,前期已发现IL-17是参与自身免疫性疾病发生、发展的重要炎症介质,由此推测XFC具有抗炎作用^[18-19]。实验结果显示与M组相比,治疗后小鼠AI评分、滑膜中血管翳形成数量和炎性细胞浸润明显减少,提示XFC能够显著改善CIA小鼠的关节肿胀情况,抑制血管翳的生成,抑制炎症发展,这与之前的研究结果保持一致。

现代研究认为,巨噬细胞参与机体固有免疫系统,具有吞噬、杀灭病原微生物、炎症防御等功能,在人体非特异性免疫中发挥了重要作用。在人体被外界因素刺激时,巨噬细胞会表现为活化状态,从而清除异物,来保护人体不被伤害。然而,当巨噬细胞清除异物时,也随之会释放TNF- α 、IL-1等炎症因子,导致人体产生炎症反应,进而对机体某些组织造成损伤。通常巨噬细胞不会大量增多,当其受到某种信号,如巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)、表皮生长因子(EGF)的诱导时,会在机体内大量增殖。GM-CSF是一种在造血细胞产生及活性表达的过程中发挥调节作用的细胞因子。GM-CSF在正常生理条件下的表达水平较低。当人体发生感染或炎症时,GM-CSF可短时间内急剧增加。在自身免疫炎症小鼠模型中,GM-CSF阻断剂减少了中性粒细胞和单核细胞的聚集,从而降低疾病的严重性^[20]。此外,GM-CSF还能将巨噬细胞极化为M1型巨噬细胞,产生并分泌TNF- α 、诱导型一氧化氮合酶(inducible nitric oxide synthase, iNOS)等致炎因子^[21]。CD68是巨噬细胞的通用标志物,可以同时识别M1和M2两种表型^[22]。iNOS的表达和活性可用于M1型和M2型巨噬细胞的鉴别,在巨噬细胞中,M1型则以高度表达MCP-1和iNOS等促炎细胞因子为标志^[23-24]。CIA动物模型中,XFC组CD68、iNOS的蛋白表达水平显著低于模型组,由此推测XFC可能通过下调滑膜组织中M1型巨噬细胞的表达抑制促炎细胞的释放,以减轻关节炎。

综上所述,新风胶囊可缓解因滑膜炎导致的

关节红肿疼痛,并可能通过下调滑膜组织中M1型巨噬细胞表达,抑制炎症因子的产生和分泌,从而对CIA小鼠模型产生保护作用。

(本文图1见插图2-1)

参考文献

- [1] HUANG YT, GUO LB, CHITTI R, et al. Wogonin ameliorate complete Freund's adjuvant induced rheumatoid arthritis via targeting NF- κ B/MAPK signaling pathway [J]. *BioFactors* (Oxford, England), 2020, 46(2):283-291.
- [2] 肖靖杰,吴磊,张伟,等.脂连蛋白降低氯化钴诱导的巨噬细胞凋亡及机制[J].*细胞与分子免疫学杂志*,2018,34(9):769-775.
- [3] NAVEGANTES KC, DE SOUZA GOMES R, PEREIRA PAT, et al. Immune modulation of some autoimmune diseases: the critical role of macrophages and neutrophils in the innate and adaptive immunity[J]. *J Transl Med*, 2017, 15(1): 36.
- [4] 罗维,艾磊,王博发,等.慢性高糖作用下小鼠骨骼肌成肌细胞对巨噬细胞极化的影响[J].*免疫学杂志*,2020,36(11):935-942.
- [5] CAO YX, LIU J, HUANG CB, et al. Wilforlide A ameliorates the progression of rheumatoid arthritis by inhibiting M1 macrophage polarization[J]. *Journal of Pharmacological Sciences*, 2022, 148(1):116-124.
- [6] CHEN H, SHI H, LIU Y, et al. Activation of corticotropin-releasing factor receptor 1 aggravates dextran sodium sulphate-induced colitis in mice by promoting M1 macrophage polarization[J]. *Molecular Medicine Reports*, 2018, 17(1):234-242.
- [7] WYNN TA, CHAWLA A, POLLARD JW. Macrophage biology in development, homeostasis and disease [J]. *Nature*, 2013, 496(7446):445-455.
- [8] CHOI S, YOU S, KIM D, et al. Transcription factor NFAT5 promotes macrophage survival in rheumatoid arthritis[J]. *Journal of Clinical Investigation*, 2017, 127(3):954-969.
- [9] PARK SY, LEE SW, LEE SY, et al. SIRT1/Adenosine monophosphate-activated protein kinase α signaling enhances macrophage polarization to an anti-inflammatory phenotype in rheumatoid arthritis[J]. *Frontiers in Immunology*, 2017, 8: 1135. DOI: 10.3389/fimmu.2017.01135.
- [10] 张攀科,王芳,张国胜.小活络丹合桂枝芍药知母汤加减治疗风湿性关节炎寒湿痹阻证的临床观察[J].*中国实验方剂学杂志*,2017,23(3):181-186.
- [11] WANG B, CHEN MZ. Astragaloside IV possesses antiarthritic effect by preventing interleukin 1 β -induced joint inflammation and cartilage damage[J]. *Archives of Pharmacal Research*, 2014, 37(6):793-802.
- [12] LI P, YANG X, YANG Y, et al. Synergistic effect of all-trans-retinal and triptolide encapsulated in an inflammation-targeted nanoparticle on collagen-induced arthritis in mice [J]. *Journal of Controlled Release*, 2020, 319:87-103.
- [13] 徐叔云,卞如濂,陈修.药理学实验方法学[M].北京:人民卫生出版社,2003.
- [14] KIM D, DAY T, FUSELER J, et al. Splenectomy attenuates streptococcal cell wall-induced arthritis and alters leukocyte activation [J]. *Arthritis Rheum*, 2003, 48: 3557.
- [15] 曹云祥,刘健,黄传兵,等.类风湿关节炎从痰论治研究进展[J].*中华中医药杂志*,2021,36(2):983-985.
- [16] ZHANG ZH, CAO Y, YUAN Q, et al. Shexiang-wulong pills attenuate rheumatoid arthritis by alleviating inflammation in a mouse model of collagen-induced arthritis[J]. *Evid Based Complementary Altern Med*, 2019, 2019: 5308405. DOI: 10.1155/2019/5308405.
- [17] 王桂珍,刘健,黄传兵,等.新风胶囊联合中药熏洗治疗类风湿关节炎的临床疗效研究[J].*时珍国医国药*,2018,29(2):374-376.
- [18] LANE PJL, GASPAL FM, MCCONNELL FM, et al. Lymphoid tissue inducer cells: innate cells critical for CD4+ T cell memory responses? [J]. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 2012, 1247:1-15.
- [19] 曹云祥,刘健,黄传兵,等.新风胶囊可以调节类风湿性关节炎患者的免疫功能和改善心功能[J].*细胞与分子免疫学杂志*,2015,31(3):394-396,401.
- [20] COOK AD, TURNER AL, BRAINE EL, et al. Regulation of systemic and local myeloid cell subpopulations by bone marrow cell-derived granulocyte-macrophage colony-stimulating factor in experimental inflammatory arthritis [J]. *Arthritis Rheum*, 2011, 63(8):2340-2351.
- [21] KRAUSGRUBER T, BLAZEK K, SMALLIE T, et al. IRF5 promotes inflammatory macrophage polarization and TH1-TH17 responses [J]. *Nat Immunol*, 2011, 12(3): 231-238.
- [22] JUBB AM, SOILLEUX EJ, TURLEY H, et al. Expression of vascular notch ligand delta-like 4 and inflammatory markers in breast cancer [J]. *Am J Pathol*, 2010, 176(4): 2019-2028.
- [23] ORECCHIONI M, GHOSHEH Y, PRAMOD AB, et al. Macrophage polarization: different gene signatures in M1 (LPS+) vs. classically and M2 (LPS-) vs. alternatively activated macrophages [J]. *Frontiers in Immunology*, 2019, 10: 1084. DOI: 10.3389/fimmu.2019.01084.
- [24] 管新竹,王怡茹,张一凡,等.ERK5对M1型巨噬细胞标志炎症因子iNOS、MCP-1表达的影响[J].*暨南大学学报(自然科学与医学版)*,2020,41(1):10-15.

(收稿日期:2022-02-07,修回日期:2022-03-06)