doi: 10.3969/j.issn.1009-6469.2020.01.033

◇临床医学◇

乳腺癌易感基因相关蛋白 1 的表达与胃癌预后的相关性

杨兰艳, 殷芳, 郑盛, 王建刚

作者单位: 云南省第三人民医院消化内科, 云南 昆明 650000

通信作者: 殷芳, 女, 副主任医师, 研究方向为肝脏疾病, E-mail: yinfang19761218@163.com。

摘要: **目的** 探讨胃癌组织中乳腺癌易感基因相关蛋白 1(BAP1) 的表达与胃癌病人临床病理因素和预后的关系。**方法** 收集 2012 年 1 月至 2016 年 1 月云南省第三人民医院收治的 87 例手术切除的 I ~ III 期胃癌病人胃癌组织及其癌旁组织, 应用免疫组化法检测全组胃癌和癌旁组织中 BAP1 蛋白的表达水平。在 87 例病人中选取 32 例, 采用实时荧光定量聚合酶链反应(PCR) 检测胃癌和癌旁组织中 BAP1 mRNA 的表达水平, 分析 BAP1 的表达水平与临床病理特征和预后的关系。**结果** 免疫组化结果表明 BAP1 在胃癌组织和癌旁组织中的高表达率分别为 39.1% 和 66.7%, 差异有统计学意义($\chi^2 = 13.290, P = 0.000$)。PCR 检测结果显示癌组织 BAP1 mRNA 的表达明显低于癌旁组织[(1.195±0.470)比(3.399±0.891), $t = 15.320, P = 0.000$]。BAP1 的表达与胃癌病人的肿瘤分化程度、浸润深度、淋巴结转移和 TNM 分期关系密切(P 值分别为: 0.043、0.021、0.008、0.001), Kaplan-Meier 分析结果表明 BAP1 低表达组和高表达组病人 5 年生存率分别为 27.6% 和 58.2% ($\chi^2 = 6.392, P = 0.012$), 低表达组病人预后不良。Cox 回归多因素分析发现肿瘤浸润深度、TNM 分期、BAP1 表达水平是影响胃癌病人生存预后的独立危险因素($P < 0.05$)。**结论** BAP1 在胃癌组织中呈低表达, 与胃癌病人的预后密切相关。

关键词: 胃肿瘤; 基因检测; 肿瘤浸润; 免疫组织化学; 聚合酶链反应; 乳腺癌易感基因相关蛋白 1; 预后

Correlation between the expression of breast cancer susceptibility gene-related protein 1 and prognosis of gastric cancer

YANG Lanyan, YIN Fang, ZHENG Sheng, WANG Jiangan

Author Affiliation: Department of Gastroenterology, Yunnan Third People's Hospital, Kunming, Yunnan 650000, China

Abstract: Objective To study the expression of BAP1 protein levels in gastric cancer and its correlation with the clinical prognosis of gastric cancer. **Methods** Gastric cancer and matched non-tumor paracancerous tissue specimens of I - III stage were collected from 87 postoperative patients in the Third People's Hospital of Yunnan Province between Jan. 2012 and Jan. 2016. The expression of BAP1 protein in 87 gastric cancer specimens and paired adjacent non-tumor tissues were detected by immunohistochemistry. Thirty two out of the 87 patients were randomly selected, and real time quantitative PCR were used to examine the expression of BAP1 mRNA levels in the 32 paired fresh gastric cancer and adjacent non-tumor tissues. The relationship between the protein expression and clinicopathological features was analyzed. **Results** The expression of BAP1 in gastric cancer tissues was significantly lower than that in adjacent non-cancerous tissues (60.9% vs. 33.3%, $\chi^2 = 13.290, P = 0.000$). BAP1 mRNA levels were lower than that in adjacent non-cancerous tissues [(1.195±0.470) vs. (3.399±0.891), $t = 15.320, P = 0.000$]. Low expression of BAP1 was significantly correlated with differentiation, depth of tumor invasion, lymph node metastasis and TNM stage ($P = 0.043, 0.021, 0.008, 0.001$, respectively). A lower expression of BAP1 demonstrated significantly poorer overall survival in gastric cancer patients than in those with higher BAP1 expression (27.6% vs. 58.2%, $\chi^2 = 6.392, P = 0.012$). Multivariate analyses suggested that depth of tumor invasion, TNM stage and BAP1 expression were independent predictors for overall survival ($P < 0.05$). **Conclusion** The expression of BAP1 in gastric cancer was down-regulated. As an independent risk factor, low expression of BAP1 indicates a poor prognosis for patients with gastric cancer.

Key words: Stomach neoplasms; Genetic testing; Neoplasm invasiveness; Immunohistochemistry; Polymerase chain reaction; Breast cancer gene 1; Prognosis

胃癌是来源于胃黏膜上皮的恶性肿瘤, 2018 年全球癌症报告显示, 全球因癌症死亡的病例中, 胃癌占 8.2%, 位居世界恶性肿瘤死因的第 2 位, 胃癌也是我国最常见的恶性肿瘤之一, 有较高的发

病率及病死率, 严重威胁着人们的健康^[1]。可行的检测方法寻找可靠有效的胃癌分子标志物, 对胃癌进行早期诊断、判断预后和分子靶向药物治疗, 从而实现个体化精准治疗是目前研究的重

要任务之一^[2]。

乳腺癌易感基因 1 (breast cancer gene 1, BRCA1) 相关蛋白 1 (BRCA1 associated protein 1, BAP1) 是由 BAP1 基因编码的一种去泛素化酶, BAP1 可参与细胞生存、细胞凋亡、DNA 修复、蛋白质泛素化等多种功能的调控, BAP1 与恶性间皮瘤、皮肤黑色素瘤、肺癌、结直肠癌、肾透明细胞癌、乳腺癌和头颈部鳞癌等多种恶性肿瘤的发生、发展和治疗预后相关^[3]。本研究通过免疫组织化学和实时荧光定量 PCR 检测 BAP1 蛋白和 mRNA 在胃癌组织及其癌旁组织中的表达, 分析 BAP1 表达与胃癌病人临床病理特征及预后的关系, 初步探讨 BAP1 在胃癌中的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集整理 2012 年 1 月至 2016 年 1 月云南省第三人民医院 87 例行手术切除的胃癌病人的胃癌及其癌旁组织标本。癌旁组织取自手术切除残端, 距离癌组织大于 5 cm, 切缘阴性。所有病人术前及术后病理学检查均确诊为胃癌, 术前均未行化疗、放疗以及其他特殊治疗, 临床诊疗资料完整。所需组织切除离体后立即取材, 标本获取后置于冻存管并立即保存在液氮中。胃癌诊断及其常规病理资料由两位经验丰富的病理科医师阅片后确诊。术后分期方法采用美国癌症联合委员会 (AJCC) 第七版的分期标准。87 例胃癌病人的年龄范围为 39~82 岁, 中位年龄为 59 岁; I 期 18 例, II 期 33 例, III 期 36 例; 全组病人均为腺癌, 其中高分化 15 例, 中分化 27 例, 低分化 45 例; 79 例病人接受了术后放和或化疗。病人或其近亲属知情同意, 本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。

病人术后出院, 每 3~6 月随访一次, 随访内容包括一般情况、临床症状体征、全身体格检查和影像学 (B 超、CT 和 MRI 等) 检查。随访起始日为术后病理确诊日期, 末次随访时间为 2019 年 2 月 21 日, 随访时间为 3~84 个月, 中位随访时间 42 个月, 无失访病例。

1.2 主要仪器及试剂 组织样品研磨仪购于北京赫得科技有限公司, 光学显微镜 BX53 购于日本奥林巴斯公司, 聚合酶链反应 (PCR) 仪购于赛默飞世尔科技 (中国) 有限公司, 紫外分光光度计购于美国 Thorlabs 公司, BAP1 兔多克隆抗体购自艾博抗 (上海) 贸易有限公司, 免疫组化 SP 法试剂盒购自北京百奥莱博科技有限公司, 二氨基联苯胺 (Diaminobenzidine, DAB) 试剂盒购自上海研生实业有限公司, Trizol 试剂购于美国 Invitrogen 公司, Rever-

tAid First Strand cDNA Synthesis Kit 试剂盒购于赛默飞世尔科技 (中国) 有限公司。

1.3 免疫组织化学 采用免疫组织化学 SP 法 (链霉菌抗生素蛋白-过氧化物酶) 检测 87 例胃癌病人胃癌及其癌旁组织的 BAP1 蛋白表达情况, 实验采用二氨基联苯胺 (DAB) 显色, 用已知阳性切片做阳性对照, 磷酸盐缓冲溶液 (PBS) 代替一抗作为阴性对照。每张切片均由两位病理医生分别评分, 最终取平均值。结合细胞染色强度和阳性细胞百分比对结果进行判定: 切片中细胞染色强度分为未染色、浅黄色、棕黄色、棕褐色, 分别记为 0~3 分; 切片中阳性细胞百分比分为 <5%、6%~25%、26%~50%、51%~75% 和 76%~100%, 分别记为 0~4 分; 两项分数相乘得到免疫反应积分作为最终得分。BAP1 蛋白表达的评分 ≤ 7 分定义为低表达, ≥ 8 分定义为高表达^[4,5]。

1.4 实时荧光定量 PCR 在全组 87 例胃癌病人中随机选取 32 例采用实时荧光定量 PCR 定量比较癌组织及其癌旁组织中 BAP1 mRNA 表达差异。将匀浆的组织参照 Trizol 试剂说明书进行提取总 RNA 进行检测, 然后参照 RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 试剂盒说明中的操作步骤将总 RNA 逆转录为 cDNA, 进行实时荧光定量 PCR, 所有样品做 3 个复孔^[6]。相关的引物序列如下: 内参照 GAPDH 的正向引物序列为 5'-ACAGTCAGCCGCATCTTCTT-3', 反向引物序列为 5'-GACAAGCTTCCCGTTCTCAG-3'; BAP1 的正向引物序列为 5'-GCTCGTGGAAGATTCGGTGT-3'; 反向引物序列为 5'-TCATCAATCACGGACGTATCATC-3'。

1.5 统计学方法 使用 SPSS 23.0 软件进行数据的录入、整理和统计学分析。BAP1 表达水平与胃癌病人临床病理特征的关系采用 χ^2 检验进行分析。计量数据以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 胃癌组织及其癌旁组织中 BAP1 mRNA 表达的差异采用配对 *t* 检验进行比较。采用 Kaplan-Meier 法分析各组病人生存时间, 并行 Log-rank 检验, Cox 回归模型用于胃癌预后的多因素分析。以 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 BAP1 在胃癌组织和癌旁组织中的表达 免疫组织化学结果表明 BAP1 主要存在于细胞核中, 呈棕黄色。87 例病人胃癌组织中, BAP1 高表达 34 例 (39.1%), 低表达 53 例 (60.9%); 87 例癌旁组织中, BAP1 高表达 58 例 (66.7%), 低表达 29 例 (33.3%), BAP1 蛋白在胃癌组织及癌旁组织中的表达差异有统计学意义 ($\chi^2 = 13.290, P = 0.000$)。

实时荧光定量 PCR 检测结果显示 32 例胃癌病

人癌组织 BAP1 mRNA 的表达明显低于癌旁组织 [(1.195±0.470)比(3.399±0.891)], 差异有统计学意义 ($t = 15.320, P = 0.000$)。见图1。

图1 乳腺癌易感基因相关蛋白1 mRNA在胃癌及癌旁组织中的表达情况

2.2 BAP1表达与临床病理学参数关系 BAP1蛋白的表达水平与胃癌病人的肿瘤分化程度、浸润深度、淋巴结转移和TNM分期关系密切, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 但与性别、年龄、肿瘤大小和生长方式无关 ($P > 0.05$)。见表1。

表1 乳腺癌易感基因相关蛋白1表达与胃癌病人临床病理特征的相关性/例

临床病理特征	例数	BAP1低表达	BAP1高表达	χ^2 值	P值
	87	53	34		
性别				0.386	0.534
男性	58	34	24		
女性	29	19	10		
年龄				0.629	0.427
< 59岁	43	28	15		
≥59岁	44	25	19		
肿瘤大小				2.364	0.124
< 5 cm	37	26	11		
≥5 cm	50	27	23		
生长方式				0.050	0.821
膨胀型	32	19	13		
浸润型	55	34	21		
分化程度				4.067	0.043
中-高分化	42	21	21		
低分化	45	32	13		
浸润深度				5.363	0.021
T1~T2	48	24	24		
T3~T4	39	29	10		
淋巴结转移				6.922	0.008
N0~N1	41	19	22		
N2~N3	46	34	12		
TNM分期				9.946	0.001
I~II期	51	24	27		
III期	36	29	7		

2.3 BAP1表达与胃癌病人预后的相关性 采用Kaplan-Meier法分析BAP1蛋白表达与病人生存期关系, 全组87例胃癌病人的中位生存期41.2个月, 3和5年生存率分别为57.4%和41.2%, 其中BAP1低表达组和高表达组病人3年生存率分别为45.2%和75.8%, 5年生存率分别为27.6%和58.2%, 与BAP1高表达组比较, 低表达组病人的生存期明显缩短, 见图2, 两者比较差异有统计学意义 ($\chi^2 = 6.392, P = 0.012$), 表明胃癌病人中BAP1低表达与不良预后密切相关。Cox回归多因素分析发现肿瘤浸润深度 ($HR = 2.435, 95\%CI: 1.453 \sim 4.328, P = 0.015$)、TNM分期 ($HR = 3.242, 95\%CI: 1.609 \sim 5.341, P = 0.008$)、BAP1表达水平 ($HR = 1.712, 95\%CI: 1.064 \sim 3.401, P = 0.020$)是影响胃癌病人生存预后的独立危险因素。

图2 乳腺癌易感基因相关蛋白1(BAP1)表达水平与胃癌病人生存期的关系

3 讨论

BAP1是一种由729个氨基酸组成的去泛素化酶, BAP1可与BRCA1的RING指状结构域的相互作用从而发挥生物学作用, BAP1可能通过调控肿瘤发生、发展中关键蛋白质的泛素化水平从而影响肿瘤的发生发展, 其作用机制尚未明确^[7]。多项研究表明, BAP1在不同肿瘤中的作用不同。一项关于BAP1与葡萄膜黑色素瘤^[8-9]、肾透明细胞癌^[10-11]、胆管癌^[12-13]、非小细胞肺癌^[14]和结直肠癌^[15]等多种恶性预后关系的荟萃分析结果显示, BAP1作为肿瘤抑制基因在多数肿瘤中呈低表达, BAP1的表达与肿瘤病理分级、浸润深度和淋巴结转移等关系密切, BAP1低表达病人恶性程度高、侵袭性强, BAP1低表达与上述恶性肿瘤病人预后不良相关, BAP1低表达可增加病人的全因死亡率, 肿瘤特异病死率和复发率, 该研究还发现通过免疫组织化学分析探讨BAP1对预后的影响是可行的, 并推荐BAP1作为恶性肿瘤病理诊断的重要分子标志物和潜在的治疗靶点^[16]。另外, 研究表明BAP1蛋白是恶性间皮瘤的可靠的诊断及预后标志

物, BAP1 结合其他间皮瘤相关蛋白有助于鉴别恶性间皮瘤、非小细胞肺癌和结直肠癌^[17-18]。BAP1 低表达可降低恶性间皮瘤细胞对吉西他滨的敏感性^[19], BAP1 低表达的恶性间皮瘤病人预后欠佳。

与以上研究结论不同, 有研究发现恶性间皮瘤 BAP1 低表达病人预后良好^[20-21]。另有研究表明 BAP1 可能在皮肤黑色素瘤、头颈部鳞癌和乳腺癌等肿瘤发生中发挥促癌作用。体外和体内实验研究均表明 BAP1 可促进皮肤黑色素瘤细胞增殖和集落形成, 并抑制肿瘤细胞凋亡, 其机制可能与 BAP1 诱导 survivin 蛋白表达有关^[22]。Qin 等^[23]的研究发现 BAP1 可通过调节转录因子 KLF5 的去泛素化促进乳腺癌细胞增殖、存活、迁移和肿瘤生长。BAP1 可能通过调节组蛋白 H2Aub 的去泛素化诱导头颈部鳞癌细胞放疗抗拒, BAP1 与头颈部鳞癌病人的预后不良有关^[24]。

目前 BAP1 在胃癌中的作用尚未明确。本研究免疫组化和实时荧光定量 PCR 检测结果表明, 与癌旁组织相比, BAP1 在胃癌病人癌组织中呈低表达, 为进一步探讨 BAP1 的表达水平与胃癌病人临床预后的关系, 我们分析了 BAP1 的表达与各种临床病理因素的关系, 结果表明 BAP1 低表达的病人肿瘤分化程度低, 局部浸润明显, 淋巴结转移率高, 临床分期晚, 生存预后不良, BAP1 的表达水平是影响胃癌病人生存预后的独立危险因素, 但确切的研究结论及其作用机制仍有待进一步研究证实。

参考文献

- [1] 潘四维, 陈青川, 安雯, 等. 2018年胃癌诊治研究进展回顾[J]. 中华医学信息导报, 2019, 34(3): 14-15.
- [2] 张静, 李文斌, 应建明. cMET基因与胃癌相关研究进展[J]. 中华病理学杂志, 2016, 45(3): 213-216.
- [3] 魏路, 姚峰. 去泛素化酶BRCA1相关蛋白1与肿瘤关系研究进展[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2018, 32(12): 1246-1248.
- [4] 刘翔, 凌志强. N-Myc下游调节基因3在胃癌组织的表达及临床意义[J]. 中华实验外科杂志, 2016, 33(2): 303-306.
- [5] 娄培培, 李春莲, 夏添松, 等. 人乳腺癌ZR-75-1细胞中RNA结合蛋白38对孕激素受体表达的调节作用及其机制[J]. 中华肿瘤杂志, 2016, 38(6): 425-429.
- [6] 张宏, 马楠, 张方圆, 等. 结直肠癌组织 δ -catenin表达与临床病理因素及预后相关性分析[J]. 中华肿瘤防治杂志, 2014, 21(18): 1429-1434.
- [7] OKINO Y, MACHIDA Y, FRANKLAND - SEARBY S, et al. BRCA1-associated protein 1 (BAP1) deubiquitinase antagonizes the ubiquitin-mediated activation of FoxK2 target genes[J]. J Biol Chem, 2015, 290(3): 1580-1591.
- [8] SHAH AA, BOURNE TD, MURALI R. BAP1 protein loss by immunohistochemistry: a potentially useful tool for prognostic prediction in patients with uveal melanoma [J]. Pathology, 2013, 45(7): 651-656.
- [9] VAN ESSEN TH, VAN PELT SI, VERSLUIS M, et al. Prognostic parameters in uveal melanoma and their association with BAP1 expression [J]. British Journal of Ophthalmology, 2014, 98(12): 1738-1743.
- [10] KAPUR P, CHRISTIE A, RAMAN JD, et al. BAP1 immunohistochemistry predicts outcomes in a multi-institutional cohort with clear cell renal cell carcinoma [J]. J Urol, 2014, 191(3): 603-610.
- [11] JOSEPH RW, KAPUR P, SERIE DJ, et al. Loss of BAP1 protein expression is an independent marker of poor prognosis in patients with low-risk clear cell renal cell carcinoma [J]. Cancer, 2014, 120(7): 1059-1067.
- [12] ANDRICI J, GOEPPERT B, SIOSON L, et al. Loss of BAP1 expression occurs frequently in intrahepatic cholangiocarcinoma [J]. Medicine (Baltimore), 2016, 95(2): e2491. DOI: 10.1097/MD.0000000000002491.
- [13] CHURI CR, SHROFF R, WANG Y, et al. Mutation profiling in cholangiocarcinoma: prognostic and therapeutic implications [J]. PLoS One, 2014, 9(12): e115383. DOI: 10.1371/journal.pone.0115383.
- [14] FAN LH, TANG LN, YUE L, et al. BAP1 is a good prognostic factor in advanced non-small cell lung cancer [J]. Clin Invest Med, 2012, 35(4): e182-e189. DOI: 10.25011/cim.v35i4.17146.
- [15] TANG J, XI S, WANG G, et al. Prognostic significance of BRCA1-associated protein 1 in colorectal cancer [J]. Med Oncol, 2013, 30(2): 541.
- [16] LUCHINI C, VERONESE N, YACHIDA S, et al. Different prognostic roles of tumor suppressor gene BAP1 in cancer: a systematic review with meta-analysis [J]. Genes Chromosomes Cancer, 2016, 55(10): 741-749.
- [17] 郭振英, 孙文勇, CARBONE M, 等. BRCA相关蛋白1在恶性间皮瘤中的表达缺失及其在鉴别诊断中的应用价值[J]. 中华病理学杂志, 2017, 46(10): 699-703.
- [18] CHUI J, VERDONK B, GILL AJ. Loss of BAP1 Expression Occurs Rarely to Never in Colorectal Adenocarcinoma [J]. Appl Immunohistochem Mol Morphol, 2018, 26(9): e91-e92. DOI: 10.1097/PAI.0000000000000506.
- [19] GUZZELLI A, MEYSAMI P, BAKKER E, et al. BAP1 Status Determines the Sensitivity of Malignant Mesothelioma Cells to Gemcitabine Treatment [J]. Int J Mol Sci, 2019, 20(2): 1-13.
- [20] FARZIN M, TOON CW, CLARKSON A, et al. Loss of expression of BAP1 predicts longer survival in mesothelioma [J]. Pathology, 2015, 47(4): 302-307.
- [21] CHOU A, TOON CW, CLARKSON A, et al. The epithelioid BAP1-negative and p16-positive phenotype predicts prolonged survival in pleural mesothelioma [J]. Histopathology, 2018, 72(3): 509-515.
- [22] KUMAR R, TAYLOR M, MIAO B, et al. BAP1 has a survival role in cutaneous melanoma [J]. J Invest Dermatol, 2015, 135(4): 1089-1097.
- [23] QIN J, ZHOU Z, CHEN W, et al. BAP1 promotes breast cancer cell proliferation and metastasis by deubiquitinating KLF5 [J]. Nat Commun, 2015, 6: 8471.
- [24] LIU X, KUMAR M, YANG L, et al. BAP1 Is a Novel Target in HPV-Negative Head and Neck Cancer [J]. Clinical cancer research: an official journal of the American Association for Cancer Research, 2018, 24(3): 600-607.

(收稿日期: 2019-06-19, 修回日期: 2019-07-02)