引用本文:张子杭,成元华,李小梅.转化生长因子- β 通路对胃癌细胞增殖、侵袭及 slug 蛋白、上皮钙黏素表达的影响[J].安徽医药,2023,27(3):486-490.DOI:10.3969/j.issn.1009-6469.2023.03.014.

◇临床医学◇

转化生长因子- β 通路对胃癌细胞增殖、侵袭及 slug 蛋白、 上皮钙黏素表达的影响

张子杭¹,成元华^{1,2},李小梅¹

作者单位:¹贵州医科大学临床医学院病理学教研室,贵州 贵阳 550004;

²贵州医科大学附属医院病理科,贵州 贵阳 550004

通信作者:成元华,男,副主任医师,硕士生导师,研究方向为肿瘤病理,Email:1187861737@qq.com

基金项目:贵州省科学技术基金项目(黔科合J字[2009]2187号)

摘要: 目的 研究转化生长因子- β (TGF- β)通路的激活与阻断对人胃癌 HGC-27 细胞增殖、侵袭及 slug 蛋白和上皮钙黏素(E-cadherin, E-cad)表达的影响。**方法** 于2021年1月至2022年1月使用外源性通路激活剂 TGF- β 1 和阻断剂 SB431542 培养胃癌细胞,后根据对细胞给药不同分为五组。空白对照组:仅使用等量常规培养基;激动剂组:TGF- β 1(25 μ g/L);阻断剂组:SB431542(2 mg/L);激动剂+低浓度阻断剂组:TGF- β 1(25 μ g/L)+SB431542(2 mg/L);激动剂+高浓度阻断剂组:TGF- β 1(25 μ g/L)+SB431542(4 mg/L)。并使用细胞计数试剂盒(CCK-8)法检测各组胃癌细胞增殖活性,使用 Transwell 侵袭实验检测各组胃癌细胞侵袭能力,使用酶联免疫吸附测定(ELISA)检测胃癌细胞中 slug 与 E-cad 两种蛋白的表达情况。**结果** 五组胃癌细胞增殖活性、侵袭能力及 slug 蛋白、E-cad 蛋白表达水平比较均差异有统计学意义($P < 0.05$)。激动剂组胃癌细胞增殖活性(24 h: 0.70 ± 0.13)和侵袭能力[细胞穿过小室膜的细胞数量(227.45 ± 5.46)个]、slug 蛋白表达水平[(149.45 ± 24.46)ng/L]高于空白对照组[24 h: 0.52 ± 0.10 、(117.81 ± 3.11)个、(101.25 ± 20.11)ng/L]($P < 0.05$),而 E-cad 蛋白表达水平(23.54 ± 9.42)ng/L 相较空白对照组(41.56 ± 25.26)ng/L 显著降低($P < 0.05$)。**结论** TGF- β 通路可通过增强 slug 蛋白表达并抑制 E-cad 表达,激活上皮-间充质转化(EMT),提高胃癌细胞的体内外增殖和侵袭能力,从而影响胃癌的进展。

关键词: 胃肿瘤; 转化生长因子 β (TGF- β); Snail 家族转录因子类; 钙黏着糖蛋白类; 信号通路

Effects of TGF- β pathway on proliferation, invasion and expression of slug and E-cad proteins in gastric cancer HGC-27 cells

ZHANG Zihang¹, CHENG Yuanhua^{1,2}, LI Xiaomei¹

Author Affiliations:¹Pathology Teaching and Research Section, Clinical Medical College, Guizhou Medical University, Guiyang, Guizhou 550004, China; ²Department of Pathology, The Affiliated Hospital of Guizhou Medical University, Guiyang, Guizhou 550004, China

Abstract: **Objective** To explore the influence of transforming growth factor- β (TGF- β) pathway activation and disruption on the proliferation and invasion of human gastric cancer HGC-27 cells and the expressions of slug and E-cadherin (E-cad). **Methods** From January 2021 to January 2022, gastric cancer cells cultured with exogenous pathway activator (TGF- β 1) and blocker (SB431542) were assigned into 5 groups according to the different drug administration for the cells: blank control group: using only the same amount of conventional medium, agonist group: TGF- β 1 (25 μ g/L), blocker group: SB431542 (2 mg/L), agonist + low-concentration blocker group: TGF- β 1 (25 μ g/L) + SB431542 (2 mg/L), and agonist + high-concentration blocker group: TGF- β 1 (25 μ g/L) + SB431542 (4 mg/L). The Cell Counting Kit-8 (CCK-8) was used to detect the proliferation activity of gastric cancer cells in each group, Transwell was used to detect the invasion ability of gastric cancer cells in each group, and the expressions of slug and E-cad in gastric cancer cells was detected by ELISA. **Results** There were significant differences in the proliferation activity, invasion ability and the expression levels of slug protein and E-cad protein among the five groups ($P < 0.05$). Proliferative activity of gastric cancer cells (24 h: 0.70 ± 0.13), invasion ability [the number of cells passing through the capsule membrane (227.45 ± 5.46)], and expression level of slug protein [(149.45 ± 24.46)ng/L] in agonist group were higher than those of the blank control group [24 h: 0.52 ± 0.10 , 117.81 ± 3.11 , (101.25 ± 20.11)ng/L] ($P < 0.05$), but the expression level of E-cad protein was significantly lower in agonist group than in control group [(23.54 ± 9.42)ng/L vs. (41.56 ± 25.26)ng/L; $P < 0.05$]. **Conclusion** TGF- β pathway can enhance the proliferation and invasion ability of gastric cancer cells in vitro and in vivo by enhancing the expression of slug protein and inhibiting the expression of E-cad, activating epithelial-mesenchymal transition (EMT), thus affecting the progression of gastric cancer.

Key words: Stomach neoplasms; Transforming growth factor beta(TGF- β); Snail family transcription factors; Cadherins; Signal pathway

胃癌起源于胃表层黏膜^[1-2]。侵袭和转移是病人死亡的主要原因^[3]。胃癌的发病率逐年升高,在全球癌症死亡率中排第二^[4],但其确切发病机制仍未完全阐明。研究发现转化生长因子- β (transforming growth factor- β , TGF- β)信号通路参与了胃癌的发生发展^[5],胃癌病人 TGF- β 1(TGF- β 通路激活剂)的高表达可能与病人预后差相关^[6-7]。当给予外源性 TGF- β 1时,肿瘤细胞的生长速度、侵袭能力和转移能力均增加^[8]。TGF- β 1通过促进肿瘤间质中血管的生长从而增强胃癌细胞侵袭能力,SB431542可抑制激活素受体样激酶(activin receptor-like kinase, ALKs)活力,是 ALK 家族中 ALK-5(TGF- β 1型受体)的有效抑制剂,SB431542使胞内信号蛋白 Smad2 和 Smad3 不能被激活,进一步抑制其磷酸化过程,TGF- β 信号通路因此被阻断。TGF- β 信号通路已被证实参与体内上皮-间充质转化(endothelial-mesenchymal transition, EMT)的激活^[9]。TGF- β 信号转导通路通过 Smads 的中间传导,使信号得以从细胞外部传入到细胞内部,是 TGF- β 信号通路传导的关键。相关研究提示,EMT 诱导转录因子 Slug 在高分化胃癌中低表达,在低分化胃癌中高表达,而上皮钙黏素(E-cadherin, E-cad)的表达则与之相反,不难推测胃癌恶性程度与 slug 蛋白的表达程度成正比,而与 E-cad 表达程度成反比。本研究于 2021 年 1 月至 2022 年 1 月,旨在探讨 TGF- β 信号通路对胃癌 HGC-27 细胞增殖侵袭能力、slug 和 E-cad 蛋白表达的影响,以期进一步为阐明胃癌的发病机制,充实实验依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 细胞系及细胞培养相关试剂 胃癌 HGC-27 细胞系购自上海传秋生物公司;细胞培养相关试剂购自 KATAWA。

1.1.2 实验主要试剂 TGF- β 1 购自美国 Enzo, TGF- β 通路阻滞剂 SB-431542 购自 MedChemExpress,二甲亚砜(DMSO)购自 Solarbio Technology 公司,细胞计数试剂盒(CCK-8)购自大连美伦生物科技有限公司,酶联免疫吸附测定(ELISA)试剂盒购自上海康朗生物科技有限公司,RIPA 细胞裂解液购自索莱宝科技公司。

1.2 实验方法

1.2.1 细胞培养 配置 88%RPMI 1640+11%胎牛血清(FBS)+1%双抗体成分的完整细胞培养基(KA-

TAWA 有限公司),在 37 °C、5%二氧化碳恒温培养箱中培养。

1.2.2 体外实验分组 根据对细胞给药不同进行分组:(1)空白对照组:仅使用等量常规培养基;(2)激动剂组:TGF- β 1(25 μ g/L);(3)阻断剂组:SB431542(2 mg/L);(4)激动剂+低浓度阻断剂组:TGF- β 1(25 μ g/L)+SB431542(2 mg/L);(5)激动剂+高浓度阻断剂组:TGF- β 1(25 μ g/L)+SB431542(4 mg/L)。

1.2.3 CCK-8 检测体外细胞增殖活性 培养胃癌细胞系 HGC-27 后,共分为五组,每组设置 5 个复孔。使用 CCK-8 试剂盒检测细胞增殖活性,在 96 孔板中配置 100 μ L 细胞悬液。将培养板放入 37 °C、5%二氧化碳培养箱中培养 24 h。根据分组情况,每孔加入试剂 10 μ L,分别于 0、6、12、24、48 和 72 h 时行 CCK-8 法检测。测量 450 nm 处的吸光度。

1.2.4 Transwell 侵袭实验检测细胞侵袭能力 配置基质胶,使其达到基质胶:PBS=1:8 的比例,将人胃癌 HGC-27 细胞以 5×10^4 个/孔的密度接种于 96 孔培养板中,置于细胞培养箱中培养 24 h 后,按照分组加入药物,在 Transwell 小室的上室膜上用棉签均匀涂抹预先配置好的基质胶,37 °C 条件下放置 30 min,小室的下室中加入 500 μ L 完全培养基,上室中加入 200 μ L 按照分组处理后的细胞悬液(无血清)。37 °C 过夜,弃去孔中培养液,使用 PBS 润洗 2 遍,用棉签轻轻擦去上层未迁移细胞,甲醛固定 30 min,将小室适当风干。用 0.1% 结晶紫染色 30~60 min,用 PBS 洗 3 遍。用棉签轻轻擦掉上室水分。于倒置显微镜下观察计数。

1.2.5 ELISA 试剂盒检测不同组细胞 slug 和 E-cad 蛋白表达情况 使用 PBS 清洗培养瓶中的细胞,冰浴条件下加入 300 μ L RIPA 细胞裂解液,反复铺匀 10 min,刮取细胞后转移至冰浴下的离心管中吹打数次,持续裂解 10 min,裂解完成后 12 000 g,4 °C,离心 5 min,吸取上清,上清液使用 ELISA 试剂盒检测,标准孔各加 50 μ L 不同标准浓度;分别设置待测空白孔和样品孔。稀释后,样品的最终稀释度为 5 倍。加入 100 μ L 酶标试剂,密封避光,37 °C 孵育 60 min,弃去液体,洗涤 5 次,显色后在 450 nm 波长处测量各孔的吸光度。根据试剂盒说明书绘制标准曲线从而计算各组细胞总蛋白中 slug 和 E-cad 蛋白浓度。

1.3 统计学方法 采用 SPSS 16.0 软件进行统计分

析。计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,多组间比较采用单因素方差分析, $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 TGF-β 通路对 HGC-27 细胞体外增殖活性的影响 使用 CCK-8 对细胞进行增殖活性检测后,结果显示:在 12 h 内,各组之间增殖能力几乎没有差别 ($P > 0.05$); 24 h 后激动剂组细胞增殖能力强于空白对照组 ($P < 0.05$); 阻断剂组细胞增殖活性在 24 h 后低于空白对照组 ($P < 0.05$); 激动剂+高浓度阻断剂与激动剂+低浓度阻断剂两组的细胞增殖活性在 24 h 内与空白对照组相比较,差异无统计学意义 ($P > 0.05$),在 24 h 后两组增殖活性出现明显下降,但与空白对照组相比较,差异无统计学意义 ($P = 0.181$)。见表 1。

2.2 使用 Transwell 侵袭实验检测体外培养人胃癌 HGC-27 细胞侵袭能力变化 各组细胞使用药物处理 24 h 后,于倒置显微镜下观察到,细胞穿过小室膜的细胞数量激动剂组多于空白对照组,阻断剂组低于空白对照组,均差异有统计学意义 (均 $P < 0.05$); 而激活剂+高浓度阻断剂组和激活剂+低浓度阻断剂组与空白对照组相比较,差异无统计学意义 ($P = 0.179$)。见表 2。

2.3 ELISA 检测体外培养 HGC-27 细胞的 slug 和 E-cad 蛋白的表达情况 激动剂组的 slug 蛋白表达

水平高于空白对照组 ($P = 0.001$); 阻断剂组 slug 蛋白表达水平低于空白对照组和激动剂组 ($P < 0.000 1$); 激动剂+高浓度阻断剂组 slug 蛋白表达水平低于激动剂组 ($P = 0.009$)。激动剂组 E-cad 蛋白水平低于空白对照组 ($P < 0.000 1$); 阻断剂组 E-cad 蛋白浓度高于其他组 ($P < 0.000 1$)。见表 3。

表 3 TGF-β 通路激活促进 slug 蛋白表达并抑制 E-cad 表达/ $\bar{x} \pm s$

组别	重复次数	Slug	E-cad
空白对照组	5	101.25±20.11	41.56±25.26
激动剂组	5	149.45±24.46 ^①	23.54±9.42 ^①
阻断剂组	5	43.16±10.26 ^①	138.55±20.44 ^①
激动剂+低浓度阻断剂组	5	87.46±15.21 ^①	38.46±10.52 ^①
激动剂+高浓度阻断剂组	5	74.22±10.12 ^①	34.16±10.22 ^①
F 值		447.59	347.26
P 值		0.007	0.011

注: TGF-β 为转录生长因子 β, slug 为 slug 蛋白, E-cad 为上皮钙黏素。

①与空白对照组比较, $P < 0.05$ 。

3 讨论

TGF-β 信号转导通路在不同肿瘤中都通过 EMT 促进肿瘤发生、转移^[10], 相关研究表明, 激活该信号通路后, 上皮细胞获得侵袭特性^[11], 其生长速度和转移能力得到提高^[12]。在 TGF-β 信号通路中, Smads 蛋白家族介导了 TGF-β 信号从细胞外进入细胞核的过程^[13], 从而诱导肿瘤细胞 EMT 的进展, 调节肿瘤细胞增殖、分化、凋亡、衰老、迁移等^[14]。

EMT 主要特征是上皮细胞标志物 E-cad 表达降低^[15], 正常生理条件下, E-cad 表达于各类正常上皮细胞^[16], 在维持细胞的极性和组织结构的完整性中起重要作用^[17]。slug 是诱导 EMT 发生的一种转录因子, 同时也是 E-cad 的上游转录因子^[18], 相关研究中发现, slug 转录因子的表达情况往往与 E-cad 表达情况相反。

本实验使用研究较少的人胃癌 HGC-27 细胞

表 2 TGF-β 通路激活和阻断后胃癌 HGC-27 细胞侵袭能力的变化/(个, $\bar{x} \pm s$)

组别	重复次数	细胞迁移数
空白对照组	5	117.81±3.11
激动剂组	5	227.45±5.46 ^①
阻断剂组	5	68.47±3.36 ^①
激动剂+低浓度阻断剂组	5	113.84±5.21 ^①
激动剂+高浓度阻断剂组	5	115.19±5.12 ^①
F 值		479.15
P 值		0.001

注: TGF-β 为转录生长因子 β。

①与空白对照组比较, $P < 0.05$ 。

表 1 TGF-β 通路促进胃癌 HGC-27 细胞增殖活性/ $\bar{x} \pm s$

组别	重复次数	0 h	6 h	12 h	24 h	48 h	72 h
空白对照组	5	0.42±0.13	0.43±0.15	0.51±0.13	0.52±0.10	0.57±0.11	0.59±0.13
激动剂组	5	0.41±0.16 ^①	0.58±0.13 ^①	0.59±0.14 ^①	0.70±0.13 ^①	0.72±0.12 ^①	0.81±0.13 ^①
阻断剂组	5	0.41±0.13 ^①	0.41±0.13 ^①	0.43±0.14 ^①	0.50±0.11 ^①	0.32±0.16 ^①	0.38±0.11 ^①
激动剂+低浓度阻断剂组	5	0.40±0.13 ^①	0.43±0.12 ^①	0.52±0.19 ^①	0.55±0.13 ^①	0.59±0.11 ^①	0.43±0.13 ^①
激动剂+高浓度阻断剂组	5	0.40±0.16 ^①	0.43±0.11 ^①	0.51±0.14 ^①	0.42±0.16 ^①	0.41±0.13 ^①	0.38±0.16 ^①
F 值		10.02	40.25	105.16	431.49	316.48	441.25
P 值		0.785	0.348	0.193	0.001	0.013	0.001

注: TGF-β 为转录生长因子 β。

①与空白对照组比较, $P < 0.05$ 。

系,丰富了TGF- β 通路研究的实验基础,旨在通过外源性药物激活和阻断TGF- β 信号通路,观察胃癌细胞在体外增殖和侵袭能力的变化以及EMT过程中相关基因slug与E-cad的蛋白表达水平的变化。

最新研究结果显示,纺锤体蛋白1(SPIN1)的表达情况与密封蛋白1(Claudin-1)成反比^[19],而Claudin-1本身是上皮细胞中slug家族的直接下游靶基因^[20]。因此可推测SPIN1蛋白通过作用于slug蛋白而调节Claudin-1的表达,Claudin-1蛋白的表达与EMT具有相当紧密的关系,而EMT的发展过程与E-cad和N-cad的蛋白表达具有直接关系^[21],因此可以认为,SPIN1蛋白与E-cad和N-cad蛋白在促癌过程中以某种方式相互作用,具体作用方式目前尚未知晓,而slug蛋白的表达在其中具有重要作用^[22]。

相关研究显示,30%的胃癌组织均显示出slug表达呈阳性^[23],而在之后的研究中显示约75%的胃癌病人均存在slug表达阳性^[24]。这两项研究结果存在较大差异的原因可能是:后者的研究中包含了更多的晚期胃癌病人。在早期的研究中,大约60%的病人处于I期,而后者的研究中只有大约30%的病人处于I期。提示slug在一定程度上可用于判断胃癌的发展情况。slug在EMT诱导中具有公认的作用^[25],因此本实验研究了slug蛋白表达情况与E-cad蛋白的表达关系。

本研究发现:使用TGF- β 通路激活剂TGF- β 1激活该通路后,slug蛋白表达上升,而E-cad蛋白表达下降,肿瘤细胞增殖与侵袭能力均上升。使用TGF- β 通路阻断剂SB431542阻断该通路后,slug蛋白表达下降,而E-cad蛋白表达水平上升,肿瘤细胞的增殖与侵袭能力均下降。在激动剂+低浓度阻断剂和激动剂+高浓度阻断剂组两组中,随阻断剂浓度的提高,通路的激动效果下降,激动剂+高浓度阻断剂组的slug蛋白表达水平低于激动剂+低浓度阻断剂组,而E-cad蛋白表达水平高于激动剂+低浓度阻断剂组;肿瘤细胞的增殖与侵袭能力也低于激动剂+低浓度阻断剂组。从而可见:阻断与激活TGF- β 通路能够改变slug与E-cad蛋白的表达情况,随slug蛋白与E-cad蛋白表达情况发生改变,肿瘤的增殖与侵袭能力发生改变,说明在该通路中slug与E-cad两种蛋白之间呈负相关,且TGF- β 通路激活水平与细胞增殖和侵袭能力成正比。

以往研究发现TGF- β 1具有能够促进胃癌SGC-7901细胞系增殖能力的作用^[26],肿瘤相关巨噬细胞(tumor-associated macrophages, TAMs)是体内TGF- β 1的主要来源^[27],耗竭TAMs后,TGF- β 1的数量下降约7倍,而肿瘤细胞的增殖能力显著下降^[28],但具体

作用机制仍然不清楚。slug在恶性肿瘤中过度表达,并能上调细胞内血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)表达,干扰slug能起到抑制胃癌血管生成的作用^[29]。本研究观察到,使用TGF- β 1激活TGF- β 通路后,slug蛋白表达显著升高,并增强了胃癌HGC-27细胞的增殖能力,而在阻断TGF- β 通路后细胞增殖活性明显下降,slug蛋白表达下降,可以推测TGF- β 1是通过激活TGF- β 通路,促进血管生成从而增强细胞增殖活性。

Matrigel在Transwell侵袭实验中充当了体内ECM的作用,细胞穿过小室膜不仅仅反映了细胞的运动能力,同时也反映了其分泌MMPS溶解ECM的能力。本研究使用Transwell侵袭实验检测人胃癌HGC-27细胞的侵袭能力时,激动剂组的细胞相较于其余各组均发挥出了较强的侵袭能力。同时测得激动剂组细胞E-cad表达下降,推测当使用TGF- β 1激活通路后,E-cad表达的下降不仅会导致细胞失去极性、降低细胞连接稳定性^[30],同时还会使胃癌细胞分泌更多的MMPS^[31],溶解掉ECM,从而增强了胃癌细胞的侵袭能力。

在使用CCK-8检测人胃癌HGC-27细胞的增殖能力时,我们发现所有组别的HGC-27细胞在起初24 h均表现为快速增殖,而添加了阻断剂组的细胞在接下来的48 h和72 h表现为增殖活性的明显下降,可能提示SB431542的起效时间往往需要24 h以上。预实验中发现:当TGF- β 1浓度高于40 μ g/L和低于10 μ g/L时,激动剂组HGC-27细胞的增殖活性不增高反而降低,这意味着较高和较低浓度的TGF- β 1可抑制胃癌细胞增殖,提示TGF- β 1的作用效果与浓度相关。在激动剂TGF- β 1(50 μ g/L和10 μ g/L)+阻断剂SB431542(2 mg/L)的非最佳浓度组中,观察到TGF- β 1和SB431542共同抑制细胞增殖,且其抑制程度大于SB431542(2 mg/L)单药组,提示TGF- β 1在某些浓度下可与SB431542共同作用从而阻断TGF- β 通路并抑制人胃癌HGC-27细胞的增殖。

综合本研究 and 文献报道可知,当TGF- β 通路被激活后,活化的TGF- β 受体1将Smad2和Smad3磷酸化,磷酸化的Smad2和Smad3与Smad4组装成异二聚体和三聚体复合物,然后进入细胞核^[32],直接与slug的启动子结合以诱导其转录,促使slug结合E-cad基因CDH1的启动子,抑制E-cad蛋白的编码而促进EMT的进展,导致N-cad的表达上升、E-cad的表达下降,TGF- β 信号通路可改变slug和E-cad蛋白的表达情况,从而调节胃癌细胞增殖和侵袭能力,而TGF- β 1和SB431542在体外实验中发挥的作

用与药物剂量和二者间相互作用有关。

参考文献

- [1] MACHLOWSKA J, BAJ J, SITARZ M, et al. Gastric cancer: epidemiology, risk factors, classification, genomic characteristics and treatment strategies[J]. *Int J Mol Sci*, 2020, 21(11): 4012-4023.
- [2] 于志红, 张娟, 刘培民. miR-107 靶向PCDH17 表达调控EMT 通路抑制胃癌细胞迁移、侵袭的分子机制[J]. *中国老年学杂志*, 2020, 40(7): 1508-1513.
- [3] SHAO L, LI P, YE J, et al. Risk of gastric cancer among patients with gastric intestinal metaplasia[J]. *Int J Cancer*, 2018, 143(7): 1671-1677.
- [4] 余超, 李晟, 曾永庆, 等. 基于 Oncomine 数据库研究钙黏附蛋白 11 基因在胃癌中的表达及意义[J]. *安徽医药*, 2022, 26(2): 356-359.
- [5] HODA K, ESTELA GG, EMMANOUIL S, et al. CRISPR-mediated reactivation of DKK3 expression attenuates TGF- β signaling in prostate cancer[J]. *Cancers*, 2018, 10(6): 165-168.
- [6] HENLEY SJ, WARD EM, SCOTT S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics [J]. *Cancer*, 2020, 126(10): 249-256.
- [7] KINDLUND B, SJÖLINGÅSA, YAKKALA C, et al. CD4+ regulatory T cells in gastric cancer mucosa are proliferating and express high levels of IL-10 but little TGF- β [J]. *Gastric Cancer*, 2017, 20(1): 1-10.
- [8] BRAHIM CBEN, COURAGEUX C, JOLLY A, et al. Proliferation genes repressed by TGF- β are downstream of Slug/Snai2 in normal bronchial epithelial progenitors and are deregulated in COPD[J]. *Stem Cell Rev Rep*, 2021, 17(3): 703-718.
- [9] 何喜, 王志强, 林韬, 等. 抑制血清应答因子表达影响转化生长因子 β 1 介导的食管癌上皮细胞-间质转化的作用研究[J]. *安徽医药*, 2020, 24(9): 1768-1771, 后插 4.
- [10] HARIYANTO NI, PURWANDHITA RP, SYAHRANI RA, et al. Role of TGF- β 1 in human breast cancer stem cells[J]. *J Pak Med Assoc*, 2021, 71(Suppl 2)(2): S84-S89.
- [11] 赵志刚, 林燕, 苏莹, 等. 胃癌中 LKB1 的表达与 EMT 及患者临床预后的关系[J]. *临床与实验病理学杂志*, 2019, 35(11): 1363-1365.
- [12] OZAKMAN Y, PAGADALA T, RAVAL D, et al. The Drosophila melanogaster metabolic response against parasitic nematode infection is mediated by TGF- β signaling[J]. *Microorganisms*, 2020, 8(7): 971-979.
- [13] HANNA A, FRANGOGIANNIS NG. The role of the TGF- β superfamily in myocardial infarction[J]. *Front Cardiovasc Med*, 2019, (6): 140-146.
- [14] POCURULL A, HERRERA-PARIENTE C, CARBALLAL S, et al. Clinical, molecular and genetic characteristics of early onset gastric cancer: analysis of a large multicenter Study[J]. *Cancers*, 2021, 13(13): 3132-3139.
- [15] ZHAO J, WU J, QIN Y, et al. LncRNA PVT1 induces aggressive vasculogenic mimicry formation through activating the STAT3/Slug axis and epithelial-to-mesenchymal transition in gastric cancer[J]. *Cell Oncol*, 2020, 43(5): 863-876.
- [16] GAO P, WANG S, JING F, et al. microRNA-203 suppresses invasion of gastric cancer cells by targeting ERK1/2/Slug/ E-cadherin signaling[J]. *Cancer Biomark*, 2017, 19(1): 11-20.
- [17] CHEN YANZHEN, LIU SHENLIN, ZOU XI. Progress in gastric cancer stem cells and epithelial-mesenchymal transition[J]. *Chin J Cancer*, 2018, 25(10): 750-754.
- [18] 胡培, 徐健, 鲍柏军. 含多西他赛联合方案治疗晚期胃癌近远期效果及对可溶性细胞间黏附因子-1 和 E-钙黏蛋白的影响[J]. *药学服务与研究*, 2021, 21(1): 37-40.
- [19] YANG L, WANG Y, WANG H. Use of immunotherapy in the treatment of gastric cancer [J]. *Oncol Lett*, 2019, 18(6): 5681-5690.
- [20] 姜琳娜, 魏娉. Slug, IMP3 和 miR-221 在食管胃交界腺癌的表达及其与 E-cadherin 的关系[J]. *胃肠病学和肝病学杂志*, 2020, 29(11): 1256-1260.
- [21] AHN HJ, MOON B, PARK M, et al. KDM3A regulates slug expression to promote the invasion of MCF7 breast cancer cells in hypoxia[J]. *Oncol Lett*, 2020, 20(6): 335-345.
- [22] TIAN X, FEI Q, DU M, et al. miR-130a-3p regulated TGF- β 1-induced epithelial-mesenchymal transition depends on SMAD4 in EC-1 cells[J]. *Cancer Med*, 2019, 20(4): 1-12.
- [23] SHI F, MA M, ZHAI R, et al. Overexpression of heat shock protein 70 inhibits epithelial-mesenchymal transition and cell migration induced by transforming growth factor- β in A549 cells [J]. *Cell Stress Chaperones*, 2021, 26(3): 505-513.
- [24] 李伟, 郑萍, 赵绍林, 等. M2 亚型巨噬细胞对胃癌细胞迁移及上皮-间质转化的影响[J]. *重庆医学*, 2021, 50(22): 3803-3809, 3815.
- [25] NI L, LI Z, SHI X, et al. Rosthorin A inhibits non-small cell lung cancer cell growth and metastasis through repressing epithelial-mesenchymal transition via downregulating Slug [J]. *Anticancer Drugs*, 2020, 31(10): 997-1003.
- [26] PENG N, LU M, KANG M, et al. Recombinant human IL-11 promotes lung adenocarcinoma A549 cell growth and EMT through activating STAT3/HIF-1 α /EMT signaling pathway [J]. *Anticancer Agents Med Chem*, 2020, 31(10): 945-957.
- [27] 刘晨, 隋红. TGF- β 信号通路介导胃癌 EMT 的研究进展[J]. *现代肿瘤医学*, 2020, 28(3): 517-520.
- [28] 田音, 胡文静, 尚杨杨, 等. 转化生长因子 β 1 诱导胃癌细胞 AGS 分泌 VEGF-C 的机制研究[J]. *局解手术学杂志*, 2020, 29(3): 180-184.
- [29] SISTO M, LISI S, RIBATTI D, et al. The role of the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in diseases of the salivary glands [J]. *Histochem Cell Biol*, 2018, 150(2): 133-147.
- [30] 陆晨晨, 胡风兰, 刘清华, 等. 钙黏附蛋白 E、N 在依维莫司抑制胃癌 SGC7901 细胞迁移中的作用[J]. *中国临床药理学杂志*, 2021, 37(7): 837-841.
- [31] OUYANG S, ZHU GD, OUYANG L, et al. Bapx1 mediates transforming growth factor- β -induced epithelial-mesenchymal transition and promotes a malignancy phenotype of gastric cancer cells [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2017, 486(2): 285-292.
- [32] 吕蓓蓓, 刘海亭, 陈旭, 等. SPIN1 通过调控上皮-间质转化促进胃癌细胞的迁移、浸润[J]. *临床与实验病理学杂志*, 2021, 37(3): 341-344.

(收稿日期: 2022-03-21, 修回日期: 2022-04-19)